

## **NASTIZOL COMPOSITUM FORTE Comprimidos**

### **Precauciones y Advertencias:**

Precauciones: Fenilefrina Clorhidrato debe usarse con cautela en pacientes con hipertensión, diabetes, trastornos de tiroides, enfermedades del corazón (isquemia de miocardio, arritmia cardiaca), glaucoma o retención urinaria debido al crecimiento de la próstata. Este producto puede interferir con los test de alergia. Advertencias: En caso de dosis excesiva llamar al médico inmediatamente. Si ocurre somnolencia no maneje automóvil, máquinas peligrosas ni tome bebidas alcohólicas. Si las molestias persisten o aparecen otros síntomas, consulte a su médico. No utilizar en caso de Embarazo o lactancia, puede causar excitación o irritabilidad en lactantes. En caso de hipersensibilidad suspenda su uso. Paracetamol: En adultos no se puede exceder de la dosis límite de 4 gramos por día. No se puede usar por más de 3 días en el tratamiento de la fiebre, sin consultar al médico. No es recomendable su uso por más de 7 días. Puede causar daño hepático y renal. Clorfeniramina maleato: Riesgo incrementado de problemas dentales por la reducción o inhibición del flujo salival. Uso prolongado sólo bajo vigilancia médica. Puede provocar somnolencia. Mantener fuera del alcance de los niños.

**Registro Sanitario:** EE-00054

**Forma Farmacéutica:** Comprimidos

**Para mayor información comunicarse** a los teléfonos 080000011 y 080000 012

**Laboratorios Bagó del Perú S.A.**

**Av. Jorge Chávez Nº 154, Miraflores. Lima 18 – Perú**